

嬰

童

百

問

■ 人之始。氣猶未定。疾
為易感。保而育之者。顧可
不知。此慎哉。苟不疾焉。是
隄而預為之取。則氣之欲
其平也。難矣。予一日得焉。

謂嬰童百問者而讀焉。通
欣然歎曰。保嬰之道其盡
是乎。古之人神睿明哲。于
凡人之所病。無不洞究而
辨之。故其為書。論辨詳

審製合精當。觀其立名爲
問。計目有百。每問下必濟
之以源。表之以證。對之以
療。若將候問。預爲答之者。
叅會衆說。自成一家。病者

遺載。方有餘奇。開卷昭然。
矇是發矣。蓋擴仁之術。不
但為已。試之案而已。說者
謂其出于魯伯嗣學所編。
今不復可考。但惜其見之

者鮮。遂命工重鑊以廣其
傳。夫百病是觸。一死用調。
人之所以平之者。固無不
至。而其所受之天者。未
有不復其平矣。是豈益

之談也哉。先儒曰。事親者
不可不知醫。子則曰。愛子
者不可無是書云。故序

金壇王肯堂字泰題

進嬰童百問疏

太子太保吏部尚書 臣許讚謹

奏爲進書事 臣係河南靈寶縣人正德二年 臣

爲翰林院編脩之時收得醫書二本名曰嬰
童百問相傳爲在昔名人著述乃以嬰童各
證設爲百問每問必究其受證之源每證必
詳其治療之方觀形審勢因病投藥極爲詳
備誠保護嬰幼之全書也此書原刻於陝西

藍田縣今乃少見伏惟

皇上至仁如天老幼幼舉一世而生成之此

若行未必不爲幼科醫藥之助

臣謹將原本

裝演

進呈伏望

皇上勅付所司再加詳校刻爲善本或以廣醫家
之見聞或以備

內府之參用傳衍流行則

皇上仁慈所被者無窮而效之所及者廣矣

嘉靖十八年二月

日具

奏奉

聖旨卿進方書朕覽已着禮部校正刊行

嬰童百問目錄

魯伯嗣學著

明

鼇峰熊宗立 校

宇泰王肯堂 訂

卷之一

初誕 第一問

朱蜜法

黃連法

甘艸法

牛黃法

黃連法

茯苓丸

護養法 第二問

消乳丸

噤風撮口臍風

第三問

千金龍膽湯

天麻丸

定命丹

朱銀丸

紫霜丸

消食丸

控痰散

甘艸湯

益脾散

辰砂膏

葱號散

蠶號散

殭蠶膏

撮風散

瓜蒂散

大連翹湯

安臍散

脉法

第四問○無方

變蒸

第五問

紫霜丸

紫陽黑散

柴胡湯

當歸散

調氣散

五臟所主

第六問○無方

五臟病證

第七問○無方

肝臟

第八問

大青膏

大黃丸

二方

導赤丸

瀉白散

益黃散

導赤散

地黃丸

心臟

第九問

導赤散

瀉心散

脾臟

第十問

益黃散

大青膏

調中丸

卷之二

肺臟 第十一問

瀉白散

甘桔湯

阿膠散

地黃丸

腎臟 第十二問

地黃丸

面上證氣色總目

第十三問。無方

發搐 第十四問

瀉毒丸

導赤散

涼驚丸

地黃丸

歸黃散

通關散

噤關散

開關聖散

至聖保命丹

省風湯

溫膽湯

玉餅子

安神丸

太膏

蘇州白丸

浴

塗顏法

珍

七寶洗心散

聖熱散

大麻防風丸

龍齒散

釣藤散

防風通聖散

大連翹湯

急驚

第十五問

利驚丸

導赤散

至寶丹

琥珀散

慢驚

第十六

括嬰湯

理中湯

五苓散

朮附湯

調氣散

桂枝湯

葛根湯

太乙保生丹

聚寶丹

蟬蝎散

神保既濟丹

來復丹

王氏惺惺散

醒脾散

大醒脾散

白丸

星香全蝎散

定命飲

四聖散

蝎四君子湯

天南星散

烏沉湯

沉香散

天南星丸

蘇合香丸

礞石丸

靈脂丸

七珍丸

四君子湯

銀白散

釣藤散

琥珀丸

龍齒散

脾風

第十卷

黑附湯

川烏散

金液丹

生附四君湯

異功散

蝎附散

醋脾散

保命丹

陰癰散

急慢脾風下痰輕重

第十八問

神保既濟丹

白殭蠶丸

辰砂膏

七寶妙砂丹

定命丹

防風丹

宣風散

枳殼散

小柴胡湯

清金丸

蘆薈散

牛黃涼膈丸

青金丹

王監京墨丸

揭風湯

硃砂膏

疎風散

銀白散

柴胡大黃湯

生氣散

異功散

茯苓二陳湯

天麻蘇合香丸

天麻防風丸

參苓白朮散

和中散

醒脾散

鎮心丸

金箔鎮心丸

珍珠丸

寶熱散

驚癇

第十九問

紫霜丸

南星散

星蘇散

五癇丸

雌黃丸

薄荷散

細辛大黃湯

何氏蛇黃丸

錢氏蛇黃湯

養正以川蛇黃丸

斷癰丹

散風散

保安丸

劉活湯

牛黃丸

比金丸

虎睛丸

七寶鎮心丸

清神湯

蜜陀僧飲

妙聖丹

天麻丸

斷癰丸

當歸大黃湯

蝎虎散

代赭石散

日應丹

地龍散

金竭五癰丸

星珠散

化風丹

鎮驚丸

開牙散

驚風 第二十問

辰砂膏

青龍丸

至寶丹

神妙奪命丹

人參羌活散

防風導赤散

蟬蛻釣藤散

天麻丸

寬熱散

七寶洗心散

神芩丸

化風丹

安神丸

清心丸

卷之三

天鈞內鈞

第二十一問

聚寶丸

鈞藤膏

魏香散

鈞藤飲

保命丸

乳香丸

木香丸

盤腸氣

第二十二問

釣藤膏

魏香散

蘇合香丸

當歸散

烏沉湯

沉香降氣湯

胎驚風

第二十三問

朱銀丸

保命丹

釣藤散

全蝎散

胎風遍身軟

第二十四問

釣藤散

全蝎散

一方

項軟

第二十五問

瀉肝丸

瀉青丸

地黃丸

五軟 第二十六問

橘連丸

地黃丸

五硬 第二十七問

小續命湯

羌活散

風證風熱 第二十八問

追風毒剉散

省風湯

羌活散

枳風通聖散

化風丹

釣藤散

至寶丹

痙症 第二十九問

小續命湯

葛根湯

桂枝加葛根湯

敗毒散

小柴胡湯

大承氣湯

大柴胡湯

夜啼客忤驚風 第三十問

釣藤散

蘇合香丸

龍齒散

碧霞散

神祿散

花火膏

牛黃丸

理中丸

清神散

卷之四

胎疾

第三十一問

大連翹飲

消風散

生地黃湯

浴體法

解頤

第三十二問

地黃丸

柏子仁散

五辛散

封顙散

桂號散

顙陷顙填

第三十三問

大連翹飲

柴胡散

封顙散

地黃丸

當歸散

目內證

第三十三問

導赤散

瀉青丸

生犀散

瀉黃散

地黃丸

牛黃丸

地黃散

小防風湯

小流氣飲

小菊花膏

民明散

蜜蒙花散

升角飲

通項石南散

耳 第三十五問

龍骨散

龍黃散

金箔散

蔓荊子散

花胭脂膏

鼻

病 第三十六問

黃芩湯

清肺飲子

薄荷湯

消風散

通關散

戶

瘡口重勝

第三十七問

保命散

吳茱萸散

洗心散

辰砂七寶散

瀉心散

牛黃散

舌木舌弄舌 第三十八問

湯黃散

胡黃連丸

商

連 第三十九問

考驚散

一

痺腮腫

第四十問

金星丸

漏蘆連翹湯

連翹湯

清涼飲子

卷五

一

遲 第四十一問

葛蒲丸

滯頤

第四十二問

張漢溫脾丹

溫胃散

益黃散

背龜胸鶴膝行遲

第四十三問

龜胸丸

地黃丸

五加皮散

松蘿丹

百合丹

臍

疳

第四十四問

四順清涼飲

七氣湯

指迷七氣湯

異香散

桔梗枳殼湯

釣藤散

芍藥甘草湯

大柴胡湯

桂枝加芍藥湯

大承氣湯

桂枝加大黃湯

腹脹

第四十五問

褐丸子

紫霜丸

白餅子

塌氣丸

三稜煎

大承氣湯

五苓散

大柴胡湯

下積丸

五珍丸

腹中有癖

第四十六問

木香丸

取癖丸

揆癖丸

痞結

第四十七問

聖惠甘遂破結散

進食丸

積痛

第四十八問

消積丸

白餅子

錢氏白朮散

小沉香丸

芍藥甘艸湯

積滯

第四十九問

木香丸

木香檳榔丸

神芩丸

推氣丸

檳榔丸

下積丸

五珍丸

諸熱證

第五十問

敗毒散

四順清涼散

惺惺散

柴胡散

寬熱散

金粉散

卷之六

傷寒正夢傷寒夾驚

第五十一問

羌活散

柴胡散

三黃散

龍龍丸

竹葉石膏湯

洗心散

辰砂七寶散

薄荷散

紅綿散

葱白湯

羌活湯

小兒傷寒

三時氣同異

第五十一問

問

升麻湯

解肌湯

調中湯

射干湯

半夏桂枝湯

五苓散

姜糖湯

七寶散

柴胡石膏湯

傷寒表裏

第五十三問

麻黃湯

葱白湯

解肌湯

葛根湯

柴胡散

桂枝麻黃各半湯

小承氣湯

大承氣湯

四順飲

洗心散

小柴胡湯

五苓散

桂枝湯

桂枝加芍藥湯

桂枝加大黃湯

四逆湯

理中湯

大柴胡湯

陰旦湯

白虎加人參湯

小建中湯

玉露散

脫甲散

傷寒咳嗽傷風

第五十四問

亭藤丸

麻黃湯

甘桔湯

瀉白散

白餅子

麥煎散

九寶飲

華蓋散

細辛五味子湯

抱龍丸

金星丸

百部丸

生犀散

天麻定喘飲

小青龍湯

柴胡散

柴胡石膏湯

天麻防風丸

惺惺散

化風丹

金沸艸散

二方

三拗湯

和解湯

自晬內嗽

第五十五問

補脾散

比金丸

大麻散

琥珀散

天麻丸

喘急 第五十六問

大效雄朱化痰定喘丸

天麻定喘飲

小青龍湯

麻黃杏子甘艸石膏湯

三拗湯

總治十六般哮喘方

葛根黃芩黃連湯 葶蘆丸

千金射干湯

又方

潮熱

第五十七問

梨漿飲子

大柴胡湯

大承氣湯

地骨皮散

犀角飲

鼈甲飲

靈犀飲

秦艽飲

生犀飲

青蒿散

柴胡散

壯熱溫壯

第五十八問

埋中湯

四君子湯

五苓散

白虎湯

柴苓散

三黃犀角散

牛黃散

地骨皮散

黃龍湯

牛黃膏

羚羊角湯

梔子仁湯

大連翹飲

六物黃芩湯

五物人參飲

龍膽湯

紫霜丸

黃疸

第五十九問

茵陳湯

梔子蘗皮湯

犀角散

連翹赤小豆湯

茵陳五苓散

當歸散

當歸丸

小半夏湯

消食丸

嘔證吐乳證 第六十問

消食丸

楊氏消乳丸

和劑觀音散

異攻散

香朴散

香薷散

五苓散

竹茹湯

蘇合香丸

青州白丸子

溫膽湯

紫霜丸

卷之七

熱吐 第六十一問

香薷散

五苓散

竹茹湯

大柴胡湯

大承氣湯

玉露散

寒冷嘔吐噦逆

第六十二問

理中湯

釀乳法

消乳丸

異攻散

香朴散

茯苓半夏湯

二陳湯

人參散

麝沉散

霍亂吐瀉

第六十三問

白餅子

益黃散

大青膏

白朮散

釣藤飲

玉露丸

五苓散

香薷散

車前飲

定命飲

理中湯

不換金正氣散

二順散

釀乳法

魁病

第六十四問

紫霜丸

益黃散

消乳丸

異功散

龍膽湯

瀉痢

第六十五問

調中湯

五苓散

車前散

潑火散

葛根湯

四逆散

冷瀉

第六十問

益黃散

沒石子丸

人參散

理中湯

來復丹

不換金正氣散

觀音散

銀白散

藿香散

熱瀉 第六十八問

錢氏白朮散

大柴胡湯

五苓散

黃連丸

四逆散

調中湯

黃芩湯

四順清涼飲

傷食瀉

第六十八問

紫霜丸

香橘餅

全蝎觀音散

調中湯

進食丸

異功散

四君子湯

益黃散

生薑瀉心湯

香朴散

白朮散

調中散

保安丸

感應丸

杏霜丸

驚瀉

第六十九問

至聖保命丹

釣藤飲

消乳丸

進食丸

辰砂五苓散

定命丹

朱君散

睡驚太乙丹

諸色痢 第七十問

石蓮散

香肺散

胃風湯

香連丸

黃連香薷散

五苓散

茅花湯

水浸丹

敗毒散

地榆散

芍藥栢皮丸

寬腸枳殼散

三黃熟艾湯

神芩丸

黃連解毒湯

潑火散

湯氏異功丸

卷之八

脫肛并痔證

第七十一問

瀉腸散

丹石散

勝雪膏

黃連解毒湯

苦參湯

便血臟毒

第七十二問

甘露飲

聚金水

犀角地黃湯

千金地黃湯

桃仁承氣湯

大便秘通

第七十三問

西順清涼飲

柴胡散

大柴胡湯

承氣湯

神芩丸

輕號散

小便不通

第七十四問

木通散

八正散

葱號散

梔子仁散

神芩丸

大小便不通

第七十五問

脫甲散

大連翹湯

神芩丸

掩臍法

五淋

第七十六問

金砂散

立效散

木通散

遺尿

第七十七問

破故紙散

共三方

白濁 第十八人開

代苓散

三稜散

分清散

疳積

九問

應發丸

肥兒丸 二方

胡黃連丸

二方

吳希亮疳方

地黃丸

生熟地黃丸

脾積丸

集聖丸

噤疳散

脂連丸

五疳良方

茯苓丸

神效換肌丸

天麻丸

地黃清肺飲

化蟻丸

靈脂丸

下蟲丸

龍膽丸

黃連丸

香薷丸

木香丸

褐丸子

黃芪湯

蠶血煎

阿蛻丸

君朴丸

痢傷 第八

肥兒丸

蘆薈丸

五疳丸

胡黃連丸

至聖丸

天麻丸

地黃丸

茯神丸

十全丹

湯氏十全丹

香薷丸

褐九子

消食丸

龜甲丸

蒸雞丸

下蟲丸

集聖丸

加味經驗黃雞煎丸

梅肉丸

卷之九

虛羸 第八十一問

木香丸

胡黃連丸

竹葉湯

四君子湯

異攻散

參苓白朮散

橘連丸

肥兒丸

保孺丸

快活丸

胃氣不和虛冷 第八十二問

益黃散

平胃散

觀音散

銀白散

食積冷熱 第八十三問

消食丸

木香丸

白餅子

丁香丸

虛實腫脹 第八十四問

分氣飲

五疳保童丸

楊氏塌氣散

塌氣丸

塌氣散

三稜煎丸

三稜丸

珍珠天麻丸

大茱連丸

下蟲丸

沉香煎

推氣丸

遇仙丹

虬蟲

第八十五問

史君子丸

檳榔散

化蟲丸

烏梅丸

陰腫疝氣

第八十六問

桃仁丸

五苓散

青木香丸

湯氏化生丸

牡丹散

三黃丸

盜汗骨蒸

第八十七問

團參湯

撲汗方

牡蠣散

龍膽湯

通神丸

生犀散

自汗

第八十八問

小柴胡湯

白虎湯

葛根黃芩黃連湯

渴證

第八十九問

三黃丸

竹葉湯

白虎湯

五苓散

香薷飲

車前散

小柴胡湯

黃連解毒湯

七物黃連湯

煩躁

第九十問

黃連解毒湯

玉露散

導赤散

至寶丹

琥珀散

青黛解毒丸

小柴胡湯

白虎湯

大柴胡湯

金箔鎮心丸

七物黃連湯

卷之十

駒齡

第九十一問

梅花飲子

吳子玉方

半夏丸

保壽散

小歸命散

解肌散

白玉丸

瘧證 第九十二問

桂枝麻黃各半湯 白虎加桂湯

小柴胡湯 柴胡桂枝湯

鬼哭散 清脾湯

四獸飲 胡黃連散

養胃湯 二瀉 經效瘧湯

大柴胡湯 木香丸

五苓散

白虎湯

柴胡石膏湯

葱白湯

知母麻黃湯

癰毒腫癰

第九十三問

天烏散

漏蘆散

青黛解毒丸

玄參劑

二方

五福化毒丹

連翹湯

青露散

驚毒掩

驚毒諸般腫痛掩子

涼膈散

惡核瘰癧

第九十四問

清涼飲

連翹丸

千金龍膽湯

大聖散

發斑

第九十五問

葛根橘皮湯

黃連橘皮湯

玄參升麻湯

化斑湯

羌活散

丹毒赤遊腫

第九十六問

冰黃散

葛根白朮散

惺兮散

敗毒散

升麻湯

防已散

白玉膏

大連翹湯

消毒飲

瘡癰

第九十七問

金華散

摩風膏

四方

羌活散

大連翹飲

升麻湯

燥瘡 第九十八問

牛黃散 三黃真珠散

瑩肌散

麻證水痘 第九十九問

黃連杏仁湯 黃芩知母湯

升麻湯 柴胡升麻湯

化斑湯 羌活散

蟬退散 消毒飲

麥煎散 大連翹湯

黃連橘皮湯

瘡疹

第一百問

惺惺散

參蘇飲

抱龍丸

升麻湯

升蘇散

香蘇散

木香散

至寶丹

四聖散

加味四聖散

紫艸木香湯

四君子湯

快斑湯

活血散

龍腦膏

猪尾膏

胡荽酒

芍藥甘艸湯

甘露飲

犀角地黃湯

消毒飲

四物湯

大連翹湯

導赤散

羌活散

小柴胡湯

白虎湯

宣風散

異攻散

決明散

紫貝散

滅瘢藥

獨聖散

牛李膏

調解散

參苓白朮散

扁鵲油劑法

三方

紫艸木通湯

蟬退膏

安斑散

如聖麥門冬散

大和散

去瘡疹癰方

龍膽丸

疳積丸

治嗽含膏丸

畫眉膏

治小兒乳嗽

大連翹飲

化風丹

玄參煎

四聖散

紅綿散

天麻丸

辰砂七寶散

常用藥方括

小續命湯

紅錦散

大連翹飲

知母葛根湯

治眼方

治心痛方

備急經驗方

嬰童百問卷之一

初誕 第一問

嬰童在胎稟陰陽五行之氣以生成五臟六腑身體之體悉具必藉胎液以滋養之受氣既足自然分挽初離母體口有液毒啼聲未出急用軟綿裹指拭去口中惡汁雖是良法然倉卒之際或有不及如法者古人有黃連法朱蜜法甘草法用之殊佳免使惡物嚥下伏之於心遇天行時氣久熱不除乃乘於心心主血脉得熱而散流溢於胃而胃主肌肉發出於外

故成瘡疹之候。世之長幼。無有可免者。若依初生拭口之法。得免痘疹之患。或有時氣侵染。只出膚瘡。細疹。易爲調理。亦孩童之幸也。楊氏云。初生拭口不前。惡穢入腹。則腹滿氣短。不能飲乳者。宜用茯苓丸加減治之。又法下胎毒。臨產落草時。濃煎淡豉汁服極好。不可與辰砂黃連輕粉等。

朱蜜法

楊氏胎後方

小兒初生。先川黃連甘草法拭口。吐其惡汁。稍時。更與朱蜜定魄安神。

朱砂

一大豆許

右細研以蜜一蜺殼許和朱砂抹口中。非獨鎮心安神。能解惡毒之物。一生免痘瘡之患。

黃連法

臨月用黃連細切。搥碎綿裹。百沸湯拭口。

甘草法

預以甘草細切少許。產臥時以綿裹沸湯泡煮。內蓋定收生之際。急以軟綿裹指蘸甘草汁拭其口。次用黃連法。朱蜜法。

又牛黃法

與朱蜜同少加牛黃益肝膽除熱定精神止驚
邪辟惡氣除小兒百病

茯苓丸

直指方

治嬰兒初生其聲未發急拭其口令惡血淨盡
不得下咽則無他病稍遲惡穢入腹則腹滿氣
短不能飲乳或胎中受寒則令兒腹痛不乳

赤茯苓

黃連

冷澄去此
加芍藥

枳殼

炒

右等分爲末煉蜜丸如桐子大每丸乳汁調下

護養法 第二回

巢氏云小兒始生。肌膚未實。不可煖衣。煖甚則令筋骨緩弱。宜頻見風日。若不見風日。則肌膚脆軟。易受損傷。當以故絮著衣。勿加新綿。天氣和煖之時。抱出日中嬉戲。數見風日。則血凝氣剛。肌肉硬密。可耐風寒。不致疾病。若藏於帷帳之內。重衣溫煖。譬如陰地草木。不見風日。軟脆不任風寒。又當薄衣。但令背煖。薄衣之法。當從秋習之。不可以春夏卒減其衣。否則令中風寒。所以從秋習之者。以漸稍寒。如此則必耐。

寒冬月但著兩薄襦可耐寒若不恐見其寒當多加耳。若愛而煖之適所以害之也。又當消息無令出汗如汗出則表虛風邪易入也。晝夜寤寐常當慎之。其乳哺之法亦當有節不可過飽。或宿滯不化當用消乳丸。化積溫脾等劑治之。陳氏所謂忍三分寒啀七分飽頻揉肚少深洗及要背煖肚煖足煖要頭涼心胸涼亦至論也。

消乳丸

又名消食丸

治宿食不消巢氏云宿食不消脾胃冷故也

兒乳哺飲食生冷過度冷氣積於脾胃胃爲水穀之海脾氣磨而消之胃氣調和則乳哺消化脉沉者傷食不化故也

縮砂仁

陳皮

京三稜

煨

蓬莪朮

煨

神麴

炒

麥蘖

炒各半兩

香附子

炒一兩

右爲末麴糊丸如麻子大食後白湯送下

噤風撮口臍風

第三問

初生噤風撮口臍風三者一種病也。噤風者。眼閉口
噤。啼聲不出。舌上聚肉如粟米狀。吮乳不得。口吐白
沫。大小便皆通。蓋由胎中感受熱氣。流毒於心脾。故
形見於喉舌間也。抑亦生下復爲風邪擊搏所致。自
滿月至百二十日。見此名曰犯風。噤。依法將護。防於
未然。則無此患。撮口者。面目黃赤。氣息喘急。啼聲不
出。蓋由胎氣挾熱。兼風邪入臍。流毒心脾之經。故令
舌強唇青。聚口撮面。飲乳有妨。若口出白沫而四肢

冷者不可救。其或肚脹青筋。弔腸卵疝。內氣引痛。皆
腸胃鬱結不通致之。治法貴乎疎利。撮口最爲惡候。
一臘內見之尤急。臍風者。斷臍之後。爲水溼風冷所
乘。風溼之氣入於臍而流於心脾。遂令肚脹臍腫。身
體重着。四肢柔直。日夜多啼。不能吮乳。甚則發爲風
搐。若臍邊青黑。撮口不開。是爲內搐。不治。爪甲黑者
卽死。其或熱在胸堂。伸引努氣。亦令臍腫。可與千金
龍膽湯。如前三者受病之源。非一朝一夕。大抵裏氣
鬱結壅閉不通。並用所卜胎毒天麻丸。定命丹。朱銀

凡之類可量與之。千金論云。小兒始生。其氣尚盛。若有微患。卽須下之。若不時下。卽成大疾。疾成則難療矣。紫霜丸可量與之。治風噤。用控痰散吐風痰。不若用甘草湯吐痰極穩。然後和胃益脾散加減用。又用辰砂膏利驚。卽愈。或手握拳禁口不開者。不治。又撮口用殭蠶膏傅唇口中。或甘草湯撮風散。臍風用瓜蒂散。湯氏治嬰兒因剪臍傷於外風。致臍瘡不乾。用白礬龍骨爲末。少許傅之。又用舊綿少許燒灰。爲末乾摻之。效。議曰。斷臍不盈尺一臘之內。隨其根蒂自

腐實者深之弱者淺之淺深之理以其稟賦得之初生之兒有熱在胸堂則頻伸引呃呃作聲努脹其氣抑入根本之中所以臍突腫赤虛大可畏無識之者將謂斷臍不利而使之然者非也此乃由胎中母多驚悸或因食熱毒之物所作宜與大連翹飲子其熱自散其臍歸本不必以藥傳之此證亦宜早治久則難療也又有一法小兒臍風撮口初生七日內患此證者百無一生如坐視其斃者良可憫焉此法極驗世罕有知者凡患此證看兒齒齦上有小泡子如粟

米狀以溫水藥熟帛裹指擦破卽開口便安不用服藥亦良法也安臍散治臍中汁出或赤腫用白石脂末日三度傅之或油髮灰或當歸末傅亦佳

千金龍膽湯

治胎驚月內氣盛發熱臍風撮口壯熱血脉盛實四肢驚掣發熱大吐及變蒸不解中客人鬼氣并諸驚癇悉皆治之十歲以下皆可服之及有魃氣者加人參當歸如龍膽數一百日童加三銖一歲加五錢

龍膽草

釣藤

柴胡

黃芩

桔梗

芍藥

茯苓

甘草

各五錢

蜣螂

二枚去翅足炙

大黃

煨二錢半

右剉散每服二錢水一盞煎半盞服之以漸加服得利卽止直指方加防風麥門冬以導心熱黃芩減半北棗煎服去蜣螂亦可

天麻丸

治因斷臍後爲水溼風冷所乘入於臍流於心脾遂令肚脹臍腫四肢柔直日夜多啼不能吮

此藥利驚化痰凡釣腸鎖肚撮口並宜服之

南星

炮一錢

白附子

炮

牙硝

天麻

五靈脂

全蝎

焙各一錢

輕粉

五分

巴霜

一字

右末糊丸麻子大每服三丸薄荷生薑煎湯下

定命丹

治急驚天釣撮口通利痰熱

全蝎

七箇

天麻

南星

炮

白附子

各二錢半

朱砂

青黛

各一錢半

輕粉

麝香

各五分

片腦

一字

右爲末。粟米糊丸。菜豆大。每服一九。荆芥薄苧湯化下。先研半丸吹入鼻中。一方無片腦。

朱銀丸

治濟風壯熱痰盛。翻眼口噤。取下胎中蘊受之毒。亦治驚積。但量情用之。一方無積字。

水銀

一錢 蒸棗肉研如泥

白附子

一錢 五分

全蝎

一錢

南星

一錢

朱砂

一錢

天漿子

去殼

牛黃

蘆薈

各一錢 二分

鉛霜

五分 和水研

片腦

一字

麝

五分

直殭蠶

炒七

右爲末。粟米糊丸。芥子大。每服一九。薄荷湯下。如未通利。加至二三九。

紫霜丸

治變蒸發熱不解。并傷寒溫壯汗後不歇。胸中有痰癖。乳哺不進。乳則吐。哕。先寒後熱者。又治食積。乳哺失節。宿滯不化。或因食而發癰。大傳酸臭。並宜服之。

代赭石

煅醋淬
七次

赤石脂

各一錢

杏仁

五十枚
去皮尖

巴豆

三十枚
去皮膜心出油

右先將杏仁巴霜入乳鉢內細研如膏却入代
赭石脂末研勻以湯浸蒸餅爲丸如粟米大一
歲服五丸米飲吞下。一二百日內見三九乳汁
下更宜量其虛實加減微利爲度。此藥兼治驚
痰諸疾雖下不致虛人。

消食丸

常服寬中快氣消乳食正顏色。

宿砂

陳皮

三稜

蓬朮

神麴

麥蘖

炒各
兩

丁香

一分

香附子

米泔
浸

枳殼炒

檳榔

烏梅各半

右爲末麪糊丸如菜豆大空心紫蘇湯下二十
九至三十九

控痰散

治風噤先用控痰散吐風痰次與益脾散和胃
又與辰砂帝利驚卽愈或手握拳禁口不開者
不治

蝎尾

銅青

各五分

朱砂

一錢

膩粉

一錢

麝香

少許

右爲末。每服一字。茶清調下。或用後甘艸湯吐痰亦可。

甘艸湯

治撮口。取吐風痰。

甘艸生一錢

右剉煎服。令吐出痰涎。却以猪乳點人口中。瘥

益脾散

白茯苓

人參

草果煨

木香

甘艸

陳皮

厚朴黃梨

蘇子炒

右等分爲末。每二錢薑棗煎服。

辰砂膏

治眼閉口噤。啼聲不出。吮乳不得。口吐白沫。大小便皆通。

辰砂 三錢 礞砂 一錢 馬牙硝 一錢 玄明粉 二錢

全蝎 五分 眞珠末 五分 麝香 一字

右爲末。和畢。用好油紙封裹。自然成膏。每服一豆粒許。諸驚。金銀箔薄。苛煎湯下。潮熱。甘草湯下。或用乳汁調傅乳上。令兒吮下。

葱號散

治初生小兒七日不小便。

葱白

三四寸

大乳

不拘多少

右同搗如泥抹兒口內卽嚙乳

蠶號散

治初生小兒七日不食乳名撮口。

僵蠶

四箇去嘴略炒

茯苓

少許

右爲末蜜稠調抹兒口內。

蠟替膏

治撮口

赤脚蜈蚣

半條炙

釣藤

一錢

朱砂

錢

直殭蠶

焙一錢

全蝎

一錢

麝香

一字

右末每服一字取竹瀝調下竹瀝解熱

撮風散

治撮口

直殭蠶

二枚去背略炒

右爲末蜜調傅唇口中

瓜蒂散

治小兒三歲忽發心滿堅硬脚手心熱則變爲黃若不急治害人甚速臍風撮口吹入鼻內啼則可醫

瓜蒂

七箇

赤小豆

七粒

秫米

七粒

右爲末用一豆許吹兩鼻內令黃水汁出殘藥未盡水調服之得吐黃水卽瘥一方瓜蒂一兩赤小豆四兩爲末每服一錢溫水調下藥下便臥卽當有吐以吐爲度吐出黃水爲妙

大連翹湯

治瘡疹壯熱小便不通諸般瘡癰丹毒疔瘡

連翹

瞿麥

荊芥

木通

當歸

防風

赤芍藥

柴胡

滑石

蟬蛻

甘艸

炙各一錢

山梔仁

黃芩

各五分

右剉細每服二錢加紫草煎溫服熱甚加大黃更詳證加減

安臍散

小兒斷臍後便傳之

赤脚蜈蚣

炙一寸

羚羊角

一錢略
燒存性

乳髮

一團燒
存性

雀甕

三枚

射香

少許

右爲末斷臍後傳於臍上

定命散

活幼方採入

治初生兒口噤不開

蟬蛻

十四箇
去嘴脚

全蝎

十四箇
去毒

右爲細末入輕粉少許和勻用乳汁調乳前服

少許

脉法

第四問○無方

仲陽云小兒脉法脉亂不治氣不和弦急傷食沈緩
虛驚促急風浮冷沈細水鏡訣夫以陰陽運命男女
成形已分九竅四肺乃生五臟六腑位分三部逆順
難明若憑寸口之浮沈必乃橫亡于孩子須明虎口
辨別三關消詳用藥必無差誤未至三歲看男左女
右虎口第二指根第一節名初關一名風關若脉見
初交病第二節爲中關又名氣關脉見病深重第三
節爲末關又名命關脉見死不治三關青是四足驚

三關赤。是水驚。三關黑。是人驚。紫色瀉利。黃色雷驚。
三關有通度脉。是極驚之證。必死。餘病可治。或青或
紅。有紋如線一直者。是乳食傷脾。及發驚熱。左右一
樣者。是驚與積齊發。有三條或散。是肺生風痰。或似
鶉鶩之聲。有赤是傷寒及嗽。如紅火。是瀉。有黑相兼。
主下痢。紅多白痢。黑多赤痢。有紫相兼。加渴不虛。虎
口脉紋亂。乃氣不和也。青驚積。青黑發慢驚。脉入掌
內平。指紋曲裏風盛。變外食積上蒸。此論三歲已上
脉法。小兒一歲至三歲。看虎口。更用指按高節。

指分三關定其息數呼吸。八至爲平脉。九至不安。十至危困。短長大小各有邪干。浮主風生。數主有驚。沈遲主虛冷。實主有熱。緊是癰癰。洪主熱盛。沈細主腹痛。沈緩主虛瀉。微遲有積。有蟲遲澀主胃脘不和。沈主乳化難。沈細主乳食結。緊弦主腹熱痛。牢實主大便秘。沈而數者骨中有熱。弦長是鬲肝有風。緊數驚風。四肢掣戰。浮洪胃口有熱。沈緊主腹痛不歇。虛濡有氣。又兼慢驚。乳多痢。大便有血。四歲用一指按虛實。五歲六歲用一指滾轉尋三部平正關上爲準。七

歲八歲稍移指少許。尋三部。九歲十歲次第依三關
部位尋取。十一十二歲亦同十歲看。十四歲十五歲
方依大方脉部位診視。凡看脉。先定浮沉遲數陰陽
冷熱。皆依大方也。沉遲爲陰。浮數爲陽。更兼看面部
青色主驚風。白色主虛瀉。赤色主痰熱。黑色病勢難
當。黃色是脾家疳積。以此相參。察其病源。審度治療
必無疎失矣。

變蒸 第五問

巢氏云。小兒變蒸者。以長氣血也。變者上氣。蒸者體

熱。

巢氏云。上多變氣。

仲陽云。變者。易也。又生。變蒸者。自內而

長。自下而上。又身熱。故以生之日。後至三十二日一

變。每變畢。卽覺性情有異於前。何者。長生。臟腑意智

故也。何謂三十二日。長骨添精神。人有三百六十五

骨。以象天數。以應椿歲。以分十二經絡。故初生至三

十三日。一變生癸。屬足少陰經腎臟。藏精與志。至六

十四日。二變一蒸生壬。屬足太陽經膀胱腑。其發耳

與魄合腎與膀胱合俱主于水。天一生水地六成之
至九十六日三變生丁屬手少陰經心臟藏神其性
爲喜至一百二十八日四變二蒸生丙屬手太陽經
小腸腑其發汗出而微驚心與小腸合主火地二生
火天七成之至一百六十日五變生乙屬足厥陰經
肝臟藏魂喜哭至一百九十二日六變三蒸生甲屬
足少陽經膽腑其發目不閉一本作開而赤肝與膽合主
木天三生木地八成之至二百二十四日七變生壬
屬手太陰肺臟藏魄主聲至二百五十六日八變生辛

蒸生庚屬手陽明經大腸肺其發膚熱而汗或不汗
肺與大腸合主金地四生金天九成之至二百八十
八日九變生巳屬足太陰經脾臟藏意與智至三百
二十日十變五蒸生戊屬足陽明經胃腑其發不食
腸痛而吐乳脾與胃合主土天五生土地十成之又
手厥陰經心包絡爲臟手少陽經三焦爲腑此一臟
一腑俱無形狀故不變而不蒸也前十變五蒸乃人
地之數以生成之此後始生齒能言知喜怒故云始
全也太倉云氣入四肢長碎骨于十變後六十四日

爲一大蒸計三百八十四日長其經脉手足手受血
故能持物足受血故能行立經云變且蒸謂蒸畢而
足一歲之日有餘也師曰不汗而熱者發其汗大吐
者微止不可別治又六十四日爲二大蒸計四百四
十八日又一百二十八日爲三大蒸共計五百七十
六日變蒸既畢兒乃成人也變者變生五臟也蒸者
蒸六腑也所以成人變者上氣蒸者體熱每經一
變一蒸情態卽異輕則發熱微汗其狀似驚重則壯
熱脉亂而數或吐或泄或煩啼燥渴輕者五日重者

者七八日解其候與傷寒相似亦有變蒸之餘續感
寒邪者但變蒸則耳冷眦冷上唇發泡狀如溺珠若
寒邪搏之則寒熱交爭腹中作痛而啼叫之聲日夜
不絕變者易也蒸于肝則目眩微赤蒸于肺則嚏嗽
毛聳凡五臟六腑筋脉骨節皆循環各有證應其治
法和平之劑微表實熱者微利之或不治亦自愈可
服紫霜丸一九或二九并黑散子柴胡湯變蒸者有
寒無熱并吐瀉不乳多啼者當歸散調氣散主之變
蒸之外小兒如常體貌情態自然端正鼻內喉中絕

無涎涕頭如青黛唇似朱鮮臉腮如花映竹情意若
天淨月明喜引方笑似此平安議曰人得中之道以
爲純粹陰陽得所剛柔兼濟氣血相和百脉相順所
以心志益通精神俱備臟腑充實形體固壯凡觀嬰
孩顙顙固合睛黑神清口方背厚骨粗腎滿臍深肚
軟齒細髮黑聲洪睡穩此乃受氣充足稟賦得中而
無疾也

紫霜丸

治證詳見第三問

代赭石

煅醋淬
七次

赤石脂

各一

杏仁

五十粒
去皮尖

巴豆

三十粒
去皮
膜心出油

右先將杏仁巴霜入乳鉢內細研如膏却入代赭石脂末研勻以湯浸蒸餅爲丸如粟米大一歲服五丸米飲湯下一二百日內兒三九乳汁下更宜量其虛實加減微利爲度此藥兼治驚痰諸疾雖下不致虛人

紫陽黑散

治變蒸解利熱氣

麻黃

一兩不去節

大黃

五錢

杏仁

去皮尖二錢半

右三味同一處搗和略燒存性再以杏仁少許研膏和之密器盛貯每用一豆許乳汁調下

柴胡湯

治變蒸骨熱心煩啼叫不已

人參

甘艸

微炙

麥門冬

去心各二錢

龍膽艸

防風

各一錢

柴胡

三錢

右剉散每服三錢煎服

當歸散

治變蒸有寒無熱

當歸 二錢 木香

官桂 鍊者 甘艸 炙

人參

各一錢

右剉散每服二錢薑棗煎服

調氣散

治變蒸吐瀉不乳多啼慢驚欲發

木香

香附子

人參

橘皮

藿香

甘艸

炙各一錢

右爲末每服二錢薑棗煎服

原缺

五臟病證 第七則○無方

肝病哭叫目直呵欠頓悶項急心病多叫哭驚悸手足動搖發熱飲水脾病困睡泄瀉不思飲食肺病慄亂哽氣長出氣喘氣急腎病目無精光畏明體骨重治療之法大抵肝病以疎風理氣爲先心病以抑火鎮驚爲急脾病當溫中消導肺病宜降氣清痰腎病則補助真元斯得其治法之大要也

肝臟 第八問

肝外主感風。呵欠頭悶。口中氣熱。當發散。大青膏主之。若能食飲水不止。當大黃丸微下。餘不可下。肝熱手尋衣領及亂捻物。瀉青丸主之。壯熱飲水喘悶瀉白散主之。肝病勝肺。肝病秋見。肝強勝肺。肺怯不能勝肝。當補脾治肝。益脾者。毋令子實故也。補脾益黃散治肝瀉青丸。肝有風目連眨不搖。得心熱則搖。治肝瀉青丸。治心導赤散主之。肝有熱目直視不搖。治同上法。肝有風甚身反張強直不搖。心不受熱也。當

補腎治肝。補腎地黃丸。治肝瀉青丸主之。凡病或新
或久。皆引肝風之動。而動止于頭目。目屬肝。風入于
目。上下左右如風吹。不輕不重。兒不能任。故目連眊
也。若熱入于目。牽其筋脉。兩眦俱緊。不能轉視。故目
直也。若得心熱。則搖。以其子母俱有實熱。風火相搏。
故也。肝病見秋。木旺肝強。勝肺也。宜補肺瀉肝。輕者
用病退。重者唇白而死。

大青膏

治傷風痰熱發搐。百日左右并二三歲亦可。

天麻 一錢 白附子 一錢 蝎尾 半錢 朱砂 一字

青黛 一錢 天竺黃 一字 麝香 一字 烏蛇 酒浸取肉焙乾

半錢

右爲末。生蜜爲丸。如芡實大。月中兒粳米大同。牛黃膏薄。苛湯化下。五歲以上同。甘露散服之。

大黃丸

治小兒無辜疳疾。急疳壯熱。疳勞。骨蒸。頭髮作穗。身上生瘡。癰癰核塊。多要啞煎。食物不成肌。膚。腹大頸細。

大黃

三錢

木香

半兩

右爲末。米醋一升相和。置銅礪中。下干錯內。浮水上炭火煮。用竹篦子攪藥。候可丸。卽丸。入稠糊丸如小豆大。二歲二十九。米湯下。加減與之。當下青膿爲效。一方治無辜疳疾。肚大。或時瀉痢。冷熱不調。漏蘆爲末。每服一錢。猪肝一兩。鹽少許煮。空心服之。

大黃丸

錢氏方

治風熱裏實。口中氣熱。大小便秘赤。飲水不止。

有下證者宜服之

黑牽牛

半生半炒五錢

川芎

半兩

甘艸

一錢炙

大黃

熟切片曝乾兩酒洗過蒸

右爲細末，稀糊和丸，如麻子大。二歲每服十九，溫蜜水下。乳後服，以瀉利爲度。未利加丸數，再服。量大小加減用之。

瀉青丸

治小兒赤眼多泪，睛疼心躁，并消熱翳急驚發搐。

當歸

川芎

防風

龍膽艸

大黃

羌活

山梔仁

各等分一方加
甘艸赤芍藥

右爲末煉蜜丸如芡實大每服一九沙糖湯下。

瀉白散

治小兒痰壅咳嗽寬氣進食。

地骨皮

桑白皮

炒各一兩

甘艸

炙一錢

右剉散入粳米一撮水二小盞煎七分食前服。

益黃散

治小兒吐瀉脾虛不食米穀不化困倦力少。

腸夜起并疳虛盜汗并治涎唾不收額下常濕
名曰滯頤。

陳皮

去白一兩

丁香

二錢一方川木香

訶子

炮去核

青皮

去穰

甘艸

炙各五錢

右爲末每服二錢水一盞煎三分食前服。

導赤散

治小兒心驚內虛邪熱。

生地黃

生甘艸

木通

各等分

右劉散竹葉七片再加黃芩赤芍藥羌活燈心

各等分水一盞煎三分食前服。

地黃丸

治腎疳腦熱肌削手足如冰滑泄肚痛

熟地黃

山茱萸

去核

乾山藥

各四錢

澤瀉

牡丹皮

白茯苓

去皮各二錢

右爲末煉蜜和丸如梧桐子大三歲以下一二丸至三丸溫水空心化下
膝五加皮

心臟 第九問

心熱視其睡口中氣溫或合面睡及上竄咬牙皆心熱也導赤散主之心氣熱則心胸亦熱欲言不能而有就冷之意故令面卧心氣實則氣上下行澀阻滯則不得通故喜仰卧則氣得上下通也瀉心散主之心病見冬大旺心強勝腎當補腎治心輕者病退重者下竄不語腎怯虛也

導赤散

治心驚內虛邪熱

生地黄 生甘州 木通 黃芩

赤芍藥 羌活 各五分 竹葉 三片 燈心 二分

右剉一劑水一盞煎五分食前服。

瀉心散

治心中痰氣實則氣行澀合卧則氣不通故喜

仰臥則上下通也。

黃連 一兩 去鬚

右爲末每服半錢或一錢臨卧時溫水下。

脾臟 第十問

脾胃不和面皖白無精光口中氣冷不思食吐水當
補脾益黃散主之脾胃虛冷面皖白色瘦弱腹痛不
思食當補脾益黃散下利者調中九主之傷風手足
冷脾臟怯也當和脾後發散和脾益黃散發大青
丸主之脾病見四旁皆倣此治之順者易治逆者難
治脾怯當面赤黃五臟相反隨證治之

益黃散

治證詳見第八問

陳皮

去白一兩

丁香

二錢一方用木香

訶子

炮去核

青皮

去穢

甘艸

炙各五錢

右爲末。每服二錢。水一盞。煎三分。食前服。

大青膏

治傷風痰熱發搐

天麻

一錢

白附子

半生一錢

蝎梢

半錢

朱砂

一字

天竺黃

一字

烏蛇

酒浸取肉焙乾半錢

麝香

一字

青黛

一錢

右爲末。生蜜爲丸。如芡實大。月中兒便服。

牛黃膏薄荷湯化下五歲以上同甘露散服之

理中丸

或作湯同

治脾胃不和中寒止衝胸脇逆滿心腹疔痛痰
逆惡心嘔吐心下虛煩痞滿膈塞不通飲食減
少短氣羸困溫中逐水止邪汗去溼洩瀉注下
水穀不分腹中雷鳴傷寒時氣內寒外熱霍亂
吐利手足厥冷胸痺心痛逆氣短氣寒多不飲
水吐者

人參

去蘆

白朮

乾薑

炮各三兩

甘草

炙減半

右咬咀每服三錢水一盞煎六分去滓帶熱服
空心食前或研細末白湯調下腹痛者加人參
一兩半寒多加乾薑一兩半渴者加白朮一兩
半臍上築者腎氣動也去白朮加桂四兩吐多
者去朮加生薑三兩下多者還用朮悸者加茯
苓二兩或四肢拘急腹滿下利轉筋者去朮加
附子一箇生用未之蜜丸如雞子黃大名理中
丸又名調中丸治厥陰臟寒虢上入膈吐長蟲
或胃中虛冷因發汗故吐蟲先服理中丸或加

枳實茯苓丸。治傷寒結胸欲絕。心下高起實滿作痛。手不得近。並用熱湯化下。